

Uso del Stesolid (Diazepam rectal)

¿Qué es stesolid y para qué se utiliza?

El *STESOLID*® es el nombre comercial de un medicamento que se llama *Diazepam*. Se presenta en forma de gel transparente y se pone por vía rectal.

El *Diazepam rectal* pertenece al grupo de las benzodiacepinas. Se usa en casos de urgencia para parar una [convulsión](#), febril o no.

¿Cómo se presenta y que dosis hay que aplicar?

Se presenta en una caja con 2 ó 5 microenemas. Estos son de color amarillo con una punta especial para aplicarlos. Tienen 2.5 ml de la solución rectal de *diazepam*.

Hay dos tamaños: 5 y 10 mg.

La dosis cambia según el peso del niño:

- Para niños entre 10-15 kg (1- 3 años): es de 5 mg (*Stesolid*® 5 mg)
- Para niños que pesan más de 16 kg (mayor de 3 años): es de 10 mg (*Stesolid*® 10 mg)

¿Cómo se debe usar este medicamento?

Antes de prescribir este medicamento, el pediatra o el neurólogo le enseñará a reconocer en qué crisis convulsivas hay que aplicarlo. También le enseñará como aplicar el gel rectal.

Leer las instrucciones antes de su uso.

Normas para el correcto uso del *Stesolid*® rectal (figura 1).






Figura 1. Normas para la correcta administración de Stesolid®

1. Para abrir el microenema, girar la lengüeta 2-3 veces, sin tirar, hasta la separación de la misma.
2. Poner al niño boca abajo o de lado. En niños pequeños se pueden poner en las rodillas de la persona que va a administrar el enema.
3. Meter el microenema por el ano, en posición vertical, presionando con los dedos índice y pulgar hasta vaciarlo.
4. Retirar el microenema y presionar las nalgas unos minutos para que no salga líquido.

¿Qué efectos secundarios podría provocar este medicamento?

Al igual que otros medicamentos puede dar efectos secundarios, aunque no todas las personas los sufren.

Los más frecuentes son: sueño, mareo, dolor de cabeza, falta de coordinación, visión doble, depresión respiratoria.

Más raros: lesiones en la piel, dolor abdominal, diarrea, debilidad muscular, vértigo, alucinaciones, inestabilidad...

¿Cómo se debe conservar?

Mantenerlo en su envase cerrado y fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente, en un lugar seco, sin mucho calor. No en el baño.

Antes de usar, mirar la fecha de caducidad.

Una vez utilizado, desechar en una farmacia.

¿Cuándo está contraindicado?

Si el niño tiene:

- Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
- Problemas respiratorios como la apnea del sueño o insuficiencia respiratoria grave.
- Glaucoma.
- Insuficiencia renal grave.
- Enfermedad muscular como la miastenia gravis.

¿Qué debe hacer en caso de sobredosis?

Avisar al 061.

Los síntomas de sobredosis puede incluir: sueño, confusión, coma, reflejos lentos.

IMPORTANTE: SIGUE LAS INSTRUCCIONES Y CONTROLES DE TÚ NEUROLOGO. SI TU HIJO/A TOMA ALGUNA MEDICACION, NO OLVIDARALA.

Ilustraciones: Patricio Carretié Warleta. *Biblioteca General de la Universidad de Málaga*

Descárgate la presentación con los PUNTOS CLAVE:

USO DEL STESOLID (DIAZEPAM RECTAL)

M^a Ángeles Caballero Morales. Pediatra
Paloma Chinarro Martínez. Pediatra



www.familiaysalud.es

Fecha de publicación: 30-04-2014

Última fecha de actualización: 20-11-18

Autor/es:

- [M^a Ángeles Caballero Morales](#). Pediatra.. Centro de Salud “Ciudad Jardín ”. Málaga.
- [Paloma Chinarro Martínez](#). Pediatra. Centro de Salud “Puerta Blanca”. Málaga

