

## El bebé y sus cuidados

### [Fontanela](#)



La **fontanela** es un **espacio** que queda vacío en el **cráneo** y que se puede observar en los niños cuando son pequeños. Estas fontanelas existen ya que si los huesos del cráneo estuvieran totalmente formados, este y el cerebro no podrían **crecer**.

[Leer más](#)

### [¿Es mi bebé prematuro?](#)



La **gestación** normal son 40 **semanas**, pero el nacimiento en la 37, 38 y 39 se considera también un nacimiento a término. Por consiguiente, un **niño prematuro** es aquel que nace antes de la 37 semana de edad gestacional.

[Leer más](#)

### [Pinzamiento de cordón](#)



Tras el parto el **cordón umbilical** se corta y se coloca una **pinza** para evitar el **sangrado**. A diferencia de métodos anteriores, en la actualidad los especialistas prefieren esperar unos minutos antes de cortarlo, ya que es beneficioso para el bebé.

[Leer más](#)

### [Criptorquidia](#)



La criptorquidia es cuando los testículos no se encuentran situados en el interior de las bolsas escrotales, sino que se encuentran dentro del abdomen.

[Leer más](#)

## [Colecho](#)



Hablamos de **colecho** cuando la madre comparte la cama con el bebé **recién nacido** o con el **lactante** pequeño. El colecho tiene **beneficios** porque favorece la lactancia materna pero siempre que sea seguro.

[Leer más](#)

## [Cascos y bandas craneales](#)



Los cascos o bandas craneales son los métodos que se utilizan actualmente para tratar ciertas deformaciones de la cabeza.

[Leer más](#)

## [Ictericia: Por qué mi recién nacido está amarillento](#)



En tres de cada diez recién nacidos a término suele aparecer a las 24 horas de vida un color de piel amarillento. Es lo que se conoce como ictericia fisiológica del recién nacido. Lo más normal es que esta coloración amarilla desaparezca al cabo de los pocos días. Por qué sucede.

[Leer más](#)

## [Dermatitis del pañal](#)



La **dermatitis del pañal** es una afección inflamatoria en la zona del pañal como consecuencia del contacto de la orina y las heces en la piel del bebé.

[Leer más](#)

## [Candidiasis Oral o Muguet](#)



La candidiasis oral o muguet es la candidiasis que más afecta a los niños pequeños. Se trata de unas placas blanquedinas que son fácilmente desprendibles.

[Leer más](#)

## [Andador](#)



El **andador o tacatá** es un artilugio que sirve para colocar al niño suspendido y que apoye los pies en el suelo de manera que es como si caminara y consigue desplazarse con él.

[Leer más](#)

## Páginas

[« primera](#)

[< anterior](#)

[1](#)

[2](#)

**3**

[4](#)

[siguiente >](#)

[última »](#)

---