
Invaginación intestinal: cuadro grave, solución sencilla

¿Qué es la invaginación intestinal?

Es una enfermedad causada por la introducción de una porción de intestino dentro de otra distal a ella.

¿Cuáles son sus causas?

En el 95% de los casos no se encuentra ninguna causa. En un 5%, son secundarias a otro proceso (adenitis, [púrpura](#), tumores, divertículos, etc.).

¿A qué edad aparecen?

Pueden aparecer a cualquier edad. Pero lo más frecuente es que afecten a niños de entre 3 meses y 6 años de edad.

¿Cuáles son sus síntomas?

El síntoma más precoz es [el vómito](#). Después, el niño comienza con una irritabilidad muy llamativa. Se asocia a estiramiento/encogimiento de las piernas. Todo esto se debe a dolor abdominal. Si el cuadro va a más, aparece letargia, aumento de la frecuencia cardíaca, palidez, sudor frío, emisión de heces con sangre y shock.

¿Cómo se diagnostica?

Se confirma gracias a una [ecografía](#) abdominal. En ésta se puede ver el “signo de la rosquilla” o una imagen en el intestino tipo “riñón falso”.

¿Cuál es el tratamiento de la invaginación?

Depende de dos factores: el tiempo de evolución y el tipo de invaginación. Si llevan más de 48 horas de evolución se tratan con cirugía. Las que llevan poco tiempo de evolución se pueden reducir con un enema o insuflando aire a través del recto. Para tratar las que son secundarias, habrá que corregir la causa que lo esté motivando de forma individualizada.

Autor/es:

- [Iván Carabaño Aguado](#). Pediatra.. Médico adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital 12 de octubre. Madrid.
- [Lucía Llorente Otones](#). Pediatra. Hospital de Fuenlabrada. Fuenlabrada (Madrid)


