

---

## ¿Qué es el divertículo de Meckel?

### ¿Es frecuente?

El divertículo de Meckel es el trastorno más frecuente del [aparato digestivo](#) al nacer. Pero es muy raro, solo lo tienen un 1-2% de las personas.

### ¿A qué se debe?

A que no se cierra el conducto onfalomesentérico. Este es un tubo que en el embrión va desde el intestino primitivo al saco vitelino. Lo normal es que se cierre solo a lo largo del embarazo. Si se queda abierto se le llama divertículo de Meckel.

### ¿Dónde está?

En el intestino delgado. A unos 60 cm de la válvula ileocecal.

### ¿Qué síntomas da?

Muchas veces no da síntomas.

Solo un tercio de los pacientes tienen síntomas. En los niños sobre todo hay hemorragia digestiva sin dolor. El sangrado ocurre por el ácido que producen las células gástricas del divertículo. Dicho ácido genera “heridas” que sangran.

Otros síntomas son: [dolor abdominal](#), [vómitos](#), [invaginación intestinal](#), obstrucción intestinal, perforación intestinal o diverticulitis.

### ¿Cómo se diagnostica?

- El pediatra puede tener sospechas si hay un sangrado por vía rectal importante, sobre todo si el niño tiene menos de cinco años de edad. La sangre puede tener un color rojo oscuro, o ser negra. Es lo que los médicos llaman “melena”.
- Se puede confirmar con una prueba de Medicina Nuclear llamada “gammagrafía”. Así se puede ver que hay de forma anormal células gástricas en el intestino.
- Si hay dudas se puede hacer un TC (“escáner”).

### ¿Cuál es el tratamiento?

- En primer lugar, si la hemorragia es importante hay que mejorar el estado del niño. Puede requerir una [trasfusión](#).
- El tratamiento definitivo es la [cirugía](#).

---

**Fecha de publicación:** 12-11-2022

**Autor/es:**

- [Iván Carabaño Aguado](#). Pediatra.. Médico adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital 12 de octubre. Madrid.

