Publicado en *Familia y Salud* (https://www.familiaysalud.es)

Onfalitis

¿Qué es?

La onfalitis es la infección del ombligo y de los tejidos que lo rodean.

¿Por qué se produce?

En los primeros 2 días de vida, al ombligo del recién nacido llegan microbios que hay en el canal del parto y en las manos de los cuidadores.

A veces estos microorganismos pueden provocar una infección.

Es más probable que ocurra cuando el parto es prolongado o ha tenido lugar en el domicilio. O si ha existido una corioamnionitis (infección del líquido amniótico), una rotura prematura de membranas, o si los cuidados del cordón no han sido adecuados. También es más frecuente en niños con bajo peso al nacer, alteraciones en la inmunidad y si necesitan un catéter umbilical.

¿Cuáles son los síntomas?

Enrojecimiento, edema, secreción y mal olor.

A veces se añade fiebre, irritabilidad, vómitos o afectación del estado general.

¿Es grave?

La mayoría de las veces cursa de forma leve. A veces puede complicarse de forma grave y requerir tratamiento.

Por ello, hay que consultar siempre si aparece enrojecimiento, edema, secreción y mal olor.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico es clínico. A veces es necesario tomar una muestra de la secreción del ombligo. Se hará un cultivo para saber qué germen está causando la infección.

Si se sospecha una infección más grave o una complicación, se realizará además una analítica.

¿Cómo se trata?

La cura en seco del cordón (mantenerlo limpio y seco) es lo más adecuado.

En lugares con tasas altas de onfalitis se recomienda un desinfectante (Clorhexidina).

En los casos moderados y graves, se darán antibióticos vía intravenosa. No se recomiendan los antibióticos tópicos porque no está clara su utilidad.

Descárgate la presentación con los PUNTOS CLAVE:

Fecha de publicación: 28-06-2016

Última fecha de actualización: 01-09-2021

Autor/es:

- Mª Pilar Tortosa Pinto. Pediatra. Centro de Salud de Almuñécar. Almuñécar (Granada)
- Aida Ruíz López. Pediatra. Hospital Universitario "San Cecilio". Granada

---