

	Tipos de insulina según el tiempo en el que actúan	Tipo de insulina según la composición	Presentaciones (marcas)	Inicio del efecto	Pico máximo	Duración del efecto	
<b>PRANDIAL</b> (se usan para el momento de la comida)	Acción Ultrarápida	Lispro	Humalog® KwikPen Humalog® 200KwikPen Humalog® vial	5-15 mtos	45-75 mtos	2-4 hs	
		Aspart	Novorapid® Flexpen Novorapid® Penfill Novorapid® Pumpcart Novorapid® vial				
		Glulisina	Apidra® SoloStar Apidra® cartuchos Apidra® vial				
	Acción rápida	Regular	Actrapid® Innolet Actrapid® vial Humulina® regular vial	30 mtos aprox	2-4 hs	5-8 hs	
<b>BASAL</b> (mantiene el efecto aunque no comamos)	Acción Intermedia	NPH	Insulatard® Flexpen Insulatard® vial Humulina® NPH KwikPen Humulina® NPH vial	2 h	4-8 hs	12 hs	
	Acción lenta	Detemir		Levemir® Flexpen Levemir® Innolet	2 h	Sin pico	12-18 hs
		Glargin a	100 U/ml	Lantus® SoloStar Abasaglar® Kwikpen Lantus® cartuchos Lantus® vial			20-24 hs
			300 U/ml	Toujeo® SoloStar			36 hs
		Degludec		Tresiba 100® Flex Touch			<40 hs
<b>MEZCLAS</b>	Con Insulina Humana	Regular + NPH	Humulina® 30:70KwikPen Humulina® 30:70 vial Mixtard® 30 Innolet Mixtard® 30 vial*	30 mtos	Doble	12 hs	
	Con análogos de insulina	Aspart + NPA	NovoMix® 30 FlexPen NovoMix® 50 FlexPen NovoMix® 70 FlexPen	10-15 mtos			
		Lispro + NPL	Humalog® Mix 25 KwikPen Humalog® Mix 50 KwikPen				