

## ¿LA CONOCES?

### ¿Qué es la sífilis?

Es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria llamada *Treponema Pallidum*.

La sífilis se trata con antibióticos pero puede provocar daño permanente en caso de no tratarse. Se contagia por el contacto sexual (vaginal, anal) sin protección con una persona infectada.

Los síntomas pueden pasar desapercibidos



### SIFILIS PRIMARIA

Llagas, úlceras o chancros en el sitio de infección, redondeados, no dolorosos pero muy contagiosos.

Suelen aparecer entre las 3 semanas y los tres meses después del contagio y desaparecen solas en 3-6 semanas.

### SIFILIS SECUNDARIA

Entre las 2-8 semanas después de los primeros síntomas. Síntomas muy variados: erupciones, cuadro gripal, llagas, pérdida de peso, caída del cabello

### SIFILIS SECUNDARIA

Diseminación a SNC, piel, corazón y sistema óseo

## DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

- El diagnóstico se realiza a través de una muestra de sangre o por la toma de muestras de las llagas si están abiertas.
- En las etapas iniciales, puede curarse fácilmente con antibióticos (penicilina).
- Sin embargo, el daño que la sífilis ya haya causado en la etapa tardía no puede revertirse ni curarse.

## PREVENCIÓN

- ✓ **COMUNICACIÓN** Hay que conocer que la sífilis existe y hablar en familia para que los jóvenes estén bien informados.
- ✓ **PROTECCIÓN DE BARRERA** El uso de métodos anticonceptivos de barrera es el método de elección. El uso de anticonceptivos orales no protege de la infección.
- ✓ **VIDA SOCIAL** La sífilis no se contagia por un contacto casual. No puedes contraerla por compartir alimentos o bebidas ni por dar un abrazo. Tampoco por darse la mano, toser, estornudar, compartir una toalla o sentarte en un inodoro

### ¿Cuándo acudir al médico?

Siempre que se haya mantenido una relación sexual sin protección y haya sospecha de contagio o cuando aparezca alguno de los síntomas mencionados.