Cómo actuar si un niño pequeño o un bebé tiene fiebre

M.ª Esther Serrano Poveda

Pediatra. CS Miguel Servet-Benicalap. Valencia











¿Qué es la fiebre?

Temperatura normal	36-37 °C axilar Hasta 37,5 °C rectal	
Febrícula	Entre 37 y 38 °C	
Fiebre moderada	Entre 38 y 39 °C	
Fiebre alta	Entre 39 y 40 °C	
Fiebre muy alta	Más de 40 °C	







Cómo medir la temperatura



Termómetro electrónico



Menores de 2 años en recto o axila

Mayores de dos años: axila

GUÍA DE AYUDA





Cómo medir la temperatura

 Ya no se usa el termómetro de mercurio por contaminante y por el riesgo de toxicidad.

- Mantener puesto 3-5 minutos.
- Poco fiables:
 - Tiras de medición cutánea en frente.
 - Termómetro ótico.
- No poner vía rectal en menores de un mes







Conviene saber...

- La fiebre es un mecanismo de defensa contra las infecciones.
- Solo se debe tratar cuando el niño está molesto.
- La intensidad de la fiebre no necesariamente responde a la gravedad de la infección.
- El niño no debe ir al centro educativo hasta su mejoría.





¿Cómo actuar?

- No abrigar ni desnudar demasiado al niño.
- No hacer friegas de alcohol o poner paños de agua fría.
- Hay que dar líquidos con frecuencia.
- Se debe vigilar signos de empeoramiento clínico.
- Dar antitérmicos si la fiebre es mayor de 38 °C y el niño se encuentra con malestar general.
- Avisar a los familiares.



Cuándo preocuparse...

- Manchas en la piel, rojo oscuro o moradas, que no desaparecen al estirar la piel de alrededor.
- Decaimiento, irritabilidad.
- Rigidez de cuello.
- Convulsión, pérdida de conocimiento o excesiva somnolencia.
- Dificultad para respirar
- Vómitos y/o diarrea persistentes
- Deshidratación (lengua seca, ausencia de saliva, ojos hundidos, etc.).
- Si no orina o la orina es escasa.







Modo de actuación

Medir la temperatura cuando haya sensación de temperatura elevada al tacto u otros signos:

- Enrojecimiento de las mejillas.
- Irritabilidad.
- Brillo en los ojos.
- Inactividad inusual.
- Sensación de frío y escalofríos.
- Taquicardia y aumento de frecuencia respiratoria.
- Exagerado descenso de los testículos dentro del escroto en los varones.


En lactantes se medirá la temperatura preferiblemente rectal, descontando $0.5\,{}^{\circ}C$







Modo de actuación









Cuándo recomendar ir al pediatra

- La fiebre dura más de 48-72 horas.
- Si tiene 3-6 meses y su temperatura supera los 39 °C, o si tiene 40 °C con cualquier edad.
- Si está muy irritable o adormilado.
- Si tiene mal aspecto general o dificultad para respirar.
- Si le aparece una erupción en la piel.
- Si el bebé tiene menos de 3 meses de edad, en cualquier caso, deber ser valorado por un profesional sanitario.





Antitérmicos

Antitérmicos		
Ibuprofeno	5-10 mg/kg/dosis cada 6-8 horas	Dosis total al día no mayor de 20 mg/kg/día
Paracetamol	10-15 mg/kg/dosis cada 4-6-8 horas	Dosis total al día no mayor de 60 mg/kg/día
Metamizol	10-15 mg/kg/dosis cada 6-8 horas	







Cálculo de dosis

Paracetamol gotas 100 mg/ml peso × 0,15 = ml por toma

Ibuprofeno 2% 100 mg/5 ml

Peso: 3 = ml en cada toma

Ibuprofeno 4% 200 mg/5 ml

peso: 6 = ml en cada toma







Tener respeto, pero no miedo



http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/infecciones/fiebre/fiebre

GUÍA DE AYUDA





